


GROUPE
savana



Catalogue

PROTECTION ET NUTRITION
DES PLANTES





VOS CULTURES ONT DROIT AU MEILLEUR

L'AFRIQUE EST BELLE !

Nous devons ensemble relever le défi d'y améliorer la sécurité alimentaire, réduire la pauvreté, protéger l'environnement et développer une industrie compétitive. Le secteur agricole africain constitue le principal pourvoyeur d'emplois et, pour assurer une croissance agricole soutenue permettant de subvenir aux besoins fondamentaux de la population, nous devons promouvoir un développement agricole reposant sur la maîtrise des techniques culturales d'intensification. La mission de SAVANA est de participer activement à ce défi.

« La terre nous a été prêtée par nos enfants »
Faisons en sorte de la leur rendre dans l'état

ou nous l'avons reçue.

« L'intensification durable de l'Agriculture »

C'est un facteur d'autant plus important aujourd'hui que les pays africains doivent assurer la compétitivité de leur agriculture dans un contexte de mondialisation marqué par de très fortes variations de nombreuses productions agricoles sur les marchés nationaux et internationaux. L'introduction, le développement et la promotion de nouveaux systèmes de production font partie des moyens que SAVANA souhaite mettre à la disposition du plus grand nombre d'agriculteurs et d'opérateurs économiques.

LÉGENDES

Gammes de produits

-  Traitement des semences
-  Herbicides
-  Insecticides
-  Fongicides
-  Coton
-  Bio
-  Nutrition/biostimulant

Iconographie

-  Herbicide Total
-  Herbicide pré-levée
-  Herbicide post-levée
-   Insecticide nématocide
-  Insecticide acaricide
-   Insecticide contre les chenilles
-   Insecticide contre les piqueurs/suceurs
-  Insecticide contre les moustiques
-  Indication de dosage

Lexique types de formulations :

- CS** : suspension de capsules
- DP** : poudre pour poudrage
- EC** : Concentré émulsionnable
- FS** : Suspension concentrée pour traitement des semences
- GE** : Produit générateur de gaz
- GR** : Granulé
- OD** : Substance huileuse
- PA** : Latex
- SC** : Suspension concentrée
- SG** : Granulé soluble dans l'eau
- SL** : Concentré soluble
- SP** : Poudre soluble dans l'eau
- UL** : Liquide pour application à ultrabas volume
- WG** : Granulé dispersable
- WP** : Poudre mouillable
- WS** : Poudre mouillable pour traitement humide des semences.

SOMMAIRE

TRAITEMENT DE SEMENCES	P.4
HERBICIDES	P.7
HERBICIDES TOTAUX	P.8
PRÉ-LEVÉE OU POST-LEVÉE	P.9 et 10
HERBICIDES DE PRÉ-LEVÉE	P.11 et 12
HERBICIDES DE POST-LEVÉE	P.13 à 17
DIVERS	P.18
INSECTICIDES	P.19
GÉNÉRAUX	P.20 à 26
NÉMATOCIDE	P.27
DENRÉES STOCKÉES	P.28
MOLLUSCICIDE	P.29
LUTTE ANTIACRIDIENNE	P.30 et 31
HYGIÈNE PUBLIQUE	P.32 et 33
COTON	P.34 à 46
FONGICIDES	P.47 à 51
BIO	P.52 à 55
NUTRITION/BIOSTIMULANT	P.56 à 59
BOIS	P.60 et 61
 SAVANA	
PRÉSENCE GÉOGRAPHIQUE	P.62
FILIALES	P.63

SAVANA FRAISE



savana TRAITEMENT DE SEMENCES



MOMTAZ[®] 45 WS

**Insecticide - Fongicide pour
le traitement des semences**

Formulation
WS

Composition
Imidaclopride : 250 g/kg
Thirame : 200 g/kg

Groupe
IRAC : 4A
FRAC : M3

Culture
Toutes cultures

Cibles
Insectes et maladies du sol

50-100 g
pour 10 kg
de semences



MOMTAZ[®] FLO 450 FS

**Insecticide -
Fongicide liquide
pour le traitement
industriel des
semences**

Formulation
FS

Composition
Imidaclopride :
350 g/l
Thirame : 100 g/l

Groupe
IRAC : 4A
FRAC : M3

Culture
Toutes cultures

Cibles
Insectes et
maladies du sol

40-70 ml
pour 10 kg
de semences



MOMTAZ[®] PRO 650 WS

**Insecticide -
Fongicide pour le
traitement des
semences**

Formulation
WS

Composition
Imidaclopride :
500 g/kg
Thirame :
150 g/kg

Groupe
IRAC : 4A
FRAC : M3

Culture
Toutes cultures

Cibles
Insectes et
maladies du sol

25-50 g
pour 10 kg
de semences

savana

TRAITEMENT DE SEMENCES



MOMTAZ[®] C 355 WS

**Insecticide -
Fongicide pour le
traitement des
semences**

Formulation
WS

Composition
Cyperméthrine :
300 g/kg
Thirame: 50 g/kg
Difenoconazole:
5 g/kg

Groupe
IRAC : 3A
FRAC: M3
FRAC: 3

Culture
Toutes cultures

Cibles
Insectes et
maladies du sol

100 g
pour 10 kg
de semences



MOMTAZ[®] SYS 380 FS

**Insecticide -
Fongicide pour le
traitement des
semences**

Formulation
FS

Composition
Thiaméthoxame :
350 g/l
M-Metalaxyl:
15g/l
Difenoconazole:
15 g/l

Groupe
IRAC : 4A
FRAC : 4
FRAC : 3

Culture
Toutes cultures

Cibles
Insectes et
maladies du sol

30 ml
pour 10 kg
de semences



MOMTAZ[®] TRIO 675 WS

**Insecticide -
Fongicide pour le
traitement des
semences**

Formulation
WS

Composition
Imidaclopride:
500 g/kg
Thirame: 150g/kg
M-Metalaxyl:
25g/kg

Groupe
IRAC : 4A
FRAC: M3
FRAC: 4

Culture
Toutes cultures

Cibles
Insectes et
maladies du sol

25-50 g
pour 10 kg
de semences





LES FERTILISANTS



FINISH® 68 SG

*Herbicide total systémique
non sélectif*

Formulation
SG

Composition
Glyphosate :
680 g/kg

Groupe
HRAC : 9

Culture
Toutes cultures

1-3
kg/ha



FINISH® | DIGA FAGALAN® 360 SL

*Herbicide total
systémique non
sélectif*

Formulation
SL

Composition
Glyphosate acide :
360 g/l

Groupe
HRAC : 9

Culture
Toutes cultures

2-4
l/ha



GENGIS® 200 SL

*Herbicide total de
contact non sélectif*

Formulation
SL

Composition
Glufosinate
Ammonium :
200 g/l

Groupe
HRAC : 10

Culture
Toutes cultures

2-5
l/ha



savana

HERBICIDES

pré-levée ou
post-levée



PRÉ-LEVÉE



POST-LEVÉE

MESOKA® 480 SC

*Herbicide systémique
anti-dicotylédone*

Formulation
SC

Composition
Mésotrione :
480 g/l

Groupe
HRAC : 27

Culture
Maïs | Sorgho

0,2-0,33
l/ha



PRÉ-LEVÉE



POST-LEVÉE

METRIBUSAV® 210 SC

*Herbicide
systémique complet*

Formulation
SC

Composition
Metribuzine :
210g/l

Groupe
HRAC : 5

Culture
Carotte | Pomme
de Terre | Canne à
sucre

1
l/ha



PRÉ-LEVÉE



POST-LEVÉE

OXI® 240 EC

Herbicide complet

Formulation
EC

Composition
Oxyfluorène :
240 g/l

Groupe
HRAC : 14

Culture
Oignon

0,75-1,5
l/ha



savana

HERBICIDES

pré-levée ou
post-levée



PRÉ-LEVÉE



POST-LEVÉE



OXO® 250 EC

Herbicide complet

Formulation
EC

Composition
Oxadiazon : 250 g/l

Groupe
HRAC : 14

Culture
Oignon | Riz

1-2
l/ha



OXO® PRO 500 WP

Herbicide complet

Formulation
WP

Composition
Oxadiazon : 500
g/kg

Groupe
HRAC : 14

Culture
Oignon | Riz

0,5-1
kg/ha



PRÉ-LEVÉE



POST-LEVÉE



PRÉ-LEVÉE



POST-LEVÉE

TROMISSIL® 50 WP

Herbicide systémique
complet

Formulation
WP

Composition
Linuron : 500 g/kg

Groupe
HRAC : 5

Culture
Carotte | Céleri | Poireau

0,5-2
kg/ha



savana

HERBICIDES

pré-levée



PRÉ-LEVÉE

ATRAMAÏS®

Herbicide systémique de pré-levée anti-dicotylédone

Formulation
WG

Composition
Atrazine : 900 g/kg

Groupe
HRAC : 5

Culture
Maïs | Mil | Sorgho | Canne à sucre | Ananas

0,9-1,5
kg/ha



PRÉ-LEVÉE

METONYX® 960 EC

Herbicide systémique de pré-levée à large spectre

Formulation
EC

Composition
S-metolachlore : 960 g/l

Groupe
HRAC : 15

Culture

Coton | Maïs | Mil | Sorgho | Niebe | Arachide | Haricot | Soja | Canne à sucre | Ananas ...

0,5-2
l/ha



PRÉ-LEVÉE

PENDISTAR® 400 EC

Herbicide antigerminatif de pré-levée à large spectre

Formulation
EC

Composition
Pendimethaline : 400 g/l

Groupe
HRAC : 3

Culture

Coton | Maïs | Oignon | Mil | Sorgho | Niebe | Arachide | Haricot | Soja | Canne à sucre...


2-6
l/ha



savana

HERBICIDES

pré-levée



PRÉ-LEVÉE

PENDISTAR® 455 CS

*Herbicide antigerminatif de
pré-levée à large spectre*

2,2-3,5
l/ha

Formulation
CS

Composition
Pendimethaline : 455 g/l

Groupe
HRAC : 3

Culture
Coton | Maïs | Oignon | Mil
| Sorgho | Niebe | Arachide
| Haricot | Soja | Canne à
sucre...



PRÉ-LEVÉE

POWER® 800 WG

*Herbicide systémique de
pré-levée à large spectre*

0,7-4
kg/ha

Formulation
WG

Composition
Diuron : 800 g/kg

Groupe
HRAC : 5


Culture
Coton | Arachide | Niebe |
Canne à sucre



savana

HERBICIDES

post-levée



POST-LEVÉE

BENTAGO® 480 SL

Herbicide systémique de post-levée

Formulation
SL

Composition
Bentazone : 480 g/l

Groupe
HRAC : 6

Culture
Pomme de Terre | Soja
| Haricot | Niébé | Pois |
Oignon

1,2-2,5
l/ha



POST-LEVÉE

MALIK® 108 EC

Herbicide systémique anti-graminée de post-levée

Formulation
EC

Composition
Haloxyp-P-
méthyl : 108 g/l

Groupe
HRAC : 1

Culture
Coton | Cultures
dicotylédones |
Oignon

0,9
l/ha



POST-LEVÉE

MALO BINFAGA® | DEKAT-D® 720 SL

Herbicide systémique anti-dicotylédone de post-levée

Formulation
SL

Composition
2,4-D sel de
diméthylamine :
720 g/l

Groupe
HRAC : 4

Culture
Riz | Canne à sucre
| Maïs | Mil | Sorgho
| Hévée | Café |
Palmier | Bananes

1-2
l/ha





POST-LEVÉE



MIRACULOUS® 110 OD

*Herbicide
systémique complet
de post-levée*

Formulation
OD

Composition
Haloxyfop-p :
100 g/l
Trifloxysulfuron
sodium : 10 g/l

Groupe
HRAC : 1
HRAC : 2

Culture
Coton

0,8-1
l/ha



POST-LEVÉE



NICOMAÏS® 40 SC

*Herbicide
systémique complet
de post-levée*

Formulation
SC

Composition
Nicosulfuron :
40 g/l

Groupe
HRAC : 2

Culture
Maïs

1-1,5
l/ha



POST-LEVÉE



NICOMAÏS® DUO 100 OD

*Herbicide
systémique complet
de post-levée*

Formulation
OD

Composition
Nicosulfuron :
40 g/l
Mésotrione :
60g/l

Groupe
HRAC : 2
HRAC : 27

Culture
Maïs

1
l/ha



POST-LEVÉE



NUGGET® 200 WP

*Herbicide
systémique
anti-dicotylédone
de post-levée*

Formulation
WP

Composition
Metsulfuron
methyl: 200g/kg

Groupe
HRAC : 2

Culture
Palmier | Hévéa

45-75
g/ha





POST-LEVÉE

OZANA® 11 OD

*Herbicide
systémique
anti-dicotylédone
de post-levée*

Formulation
OD

Composition
Trifloxysulfuron
sodium : 11 g/l

Groupe
HRAC : 2

Culture
Coton

1
l/ha



POST-LEVÉE

PYRICOT® 500 WP

*Herbicide
systémique de
post-levée*

Formulation
WP

Composition
Pyriathiobac-
sodium : 500 g/kg

Groupe
HRAC : 2

Culture
Coton

140
g/ha



POST-LEVÉE

PYRLON® 480 EC

*Herbicide de
post-levée pour
la destruction
des adventices
dicotylédones,
broussailles,
souches*

Formulation
EC

Composition
Triclopyr : 480 g/l

Groupe
HRAC : 4

Culture
Riz | Canne à sucre
| Maïs | Mil | Sorgho
| Hévéa | Café |
Palmier | Bananes

4-8
l/ha



POST-LEVÉE

QUARTZ® | KIZA® 100 EC

*Herbicide
systémique anti-
graminée de post-
levée*

Formulation
EC

Composition
Quizalofop-P-
ethyl : 100 g/l

Groupe
HRAC : 2

Culture
Coton | Cultures
dicotylédones |
Oignon

0,9
l/ha

savana

HERBICIDES

post-levée



POST-LEVÉE



RUBIS® 100 SC

*Herbicide
systémique complet
de post-levée*

Formulation
SC

Composition
Bispyribac-sodium :
100 g/l

Groupe
HRAC : 2

Culture
Riz

0,4-0,5
l/ha



POST-LEVÉE



RUBIS® SUPER 250 WP

*Herbicide
systémique complet
de post-levée*

Formulation
WP

Composition
Bispyribac-sodium :
250 g/kg

Groupe
HRAC : 2

Culture
Riz

200
g/ha



POST-LEVÉE



SAPHIR® | RAMSES® 30 OD

*Herbicide
systémique complet
de post-levée*

Formulation
OD

Composition
Rimsulfuron : 30 g/l

Groupe
HRAC : 2

Culture
Maïs | Tomates |
Pommes de terres

0,5-1
l/ha



POST-LEVÉE



TURF® 200 EC

*Herbicide
systémique
anti-dicotylédone
de post-levée*

Formulation
EC

Composition
Fluroxypyr : 200 g/l

Groupe
HRAC : 4

Culture
Palmier | Hévéa |
Café | Cacao | Maïs |
Mil | Sorgho | Riz

0,5-2
l/ha





POST-LEVÉE

XALIS® 225 OD

*Herbicide
systémique complet
de post-levée*

Formulation
OD

Composition
Cyhalofop-butyl :
200g/l
Penoxsulam : 25g/l

Groupe
HRAC : 1
HRAC : 2

Culture
Riz



1
l/ha



POST-LEVÉE

ZAMZAL® 70 EC

*Herbicide
systémique complet
de post-levée*

Formulation
EC

Composition
Quizalofop-p-ethyl:
35 g/l
Imazamox : 35g/l

Groupe
HRAC : 1
HRAC : 2

Culture
Haricot | Niébé
| Pois | Soja |
Arachide



0,5-1
l/ha





MATURAPHON® 104 LS

Stimulateur latex

Culture
Hévéa

Formulation
PA

Composition
Ethephon : 104 g/l

MATURAPHON® 50 LS

Stimulateur latex

Culture
Hévéa

Formulation
PA

Composition
Ethephon : 50 g/l



MATURAPHON® 480 SL

*Maturateur -
Régulateur de
croissance*

Formulation
SL

Composition
Ethephon : 480 g/l

Culture
Maraîchère |
Ananas

0,5-2,5
l/ha



MEPRO® 250 SL

*Régulateur de
croissance*

Formulation
SL

Composition
Chlorure de
mepiquat : 250 g/l


Culture
Coton

0,2
l/ha



INSECT- SEEDS





ACARIUS® 18 EC

Insecticide-Acaricide pour les cultures maraîchères et fruitières

Formulation
EC

Composition
Abamectine : 18 g/l

Groupe
IRAC : 6

Culture
Maraîchères - Fruitières

Cibles
Acariens, Thrips, Mouches mineuses

0,5-1
l/ha



ALPHACYGA® 180 EC

Insecticide large spectre

Formulation
EC

Composition
Alphacypermethrine : 180 g/l

Groupe
IRAC : 3A

Culture
Coton | Maraîchères

Cibles
Chenilles, Pucerons, Thrips, Doryphore, Psylles, Cicadelles, Altises, Charançons

0,1
l/ha



BENJI® 250 SP

Insecticide systémique pour le coton, les cultures maraîchères et fruitières

Formulation
SP

Composition
Acetamipride : 250 g/kg

Groupe
IRAC : 4A

Culture
Coton | Maraîchères | fruitières

Cibles
Aleurodes, Pucerons, Jassides, Mineuses

80-100
g/ha





BIOK® 16

Insecticide biologique contre les ravageurs du coton, des cultures maraîchères et céréalières

Formulation
WP

Composition
Bacillus thuringiensis : 16 000 UI/mg

Groupe
IRAC : 11

Culture
Coton | Maraîchères
| Céréales

Cibles

Piérides, Mineuses, Noctuelles, Tordeuses, Teignes et Foreurs de tiges



1-2
kg/ha



BIOK® 32

Insecticide biologique contre les ravageurs du coton, des cultures maraîchères et céréalières

Formulation
WP

Composition
Bacillus thuringiensis : 32 000 UI/mg

Groupe
IRAC : 11

Culture
Coton | Maraîchères
| Céréales

Cibles

Piérides, Mineuses, Noctuelles, Tordeuses, Teignes et foreurs de tiges



0,5-1
kg/ha



BIOPIQ®

Insecticide biologique contre les insectes piqueurs-suceurs et acariens

Formulation
SL

Composition
Matrine : 0.6%

Culture
Maraîchères | Céréales | Fruitières

Cibles

Acariens, Pucerons, Aleurodes, Thrips, Jassides



1
l/ha



CYGA® 50 EC

Insecticide à large spectre

Formulation
EC

Composition
Cyperméthrine : 50g/l

Groupe
IRAC : 3A

Culture
Maraîchères | Fruitières

Cibles

Chenilles, Pucerons, Thrips, Doryphore, Psylles, Cicadelles, Altises, Charançons



1
l/ha



savana

INSECTICIDES

généraux



EMACOT® 019 EC

Insecticide anti-chenilles

Formulation
EC


Composition
Emamectine benzoate : 19 g/l

Groupe
IRAC : 6

Culture
Coton | Maraîchères
| Céréales

Cibles
Chenilles

0,5
l/ha



EMACOT® 050 WG

Insecticide anti-chenilles

Formulation
WG

Composition
Emamectine benzoate : 50 g/kg

Groupe
IRAC : 6

Culture
Coton | Maraîchères
| Céréales

Cibles
Chenilles

200-240
g/ha



EMACOT® PRO 300 WG

Insecticide anti-chenilles

Formulation
WG

Composition
Emamectine benzoate : 300 g/kg

Groupe
IRAC : 6

Culture
Coton | Céréales

Cibles
Chenilles

40
g/ha



EMARON®

Insecticide double action contre les chenilles

Formulation
EC

Composition
Emamectine benzoate : 20 g/l
Lufenuron : 80 g/l

Groupe
IRAC : 6
IRAC : 15

Culture
Coton | Maraîchères
| Céréales

Cibles
Chenilles

0,5
l/ha





ESSEM® 800 WG

Acaricide naturel

Formulation
WG

Composition
Soufre : 800 g/kg

Groupe
IRAC : UN

Culture
Maraîchères |
Fruitières

Cibles
Acarieus

5-7,5
kg/ha



ETOILE® 150 WP

*Acaricide pour
les cultures
maraîchères et
fruitières*

Formulation
WP


Composition
Etoxazole :
150 g/kg

Groupe
IRAC : 10B

Culture
Maraîchères |
Fruitières

Cibles
Acarieus

200
g/ha



IMIDA® 30 EC

*Insecticide
systémique*

Formulation
EC

Composition
Imidaclopride :
30 g/l

Groupe
IRAC : 4A

Culture
Cacao | Café |
Maraîchères |
Vivrières |
Fruitières

Cibles
Mirides, Foreurs de
tige, Cochenilles,
Fourmis,
Coelaenomenodera,
Pucerons, Jassides,
Aleurodes, Thrips,
Charançons

1-3
l/ha



INCA® 250 WG

*Insecticide contre
les mirides, les
foreurs de tiges
et les
chenilles*

Formulation
WG

Composition
Fipronil : 250g/kg

Groupe
IRAC : 2B

Culture
Cacao | riz | café |
choux | mangue |
bananes


Cibles
Mirides, Chenilles,
Foreurs de tiges,
Mineuses, Thrips,
Scolyte des baies,
Charançons,
Mouches des fruits

80-300
g/ha

savana

INSECTICIDES

généraux



INDOXAN® 50 EC

Insecticide large spectre

Formulation
EC

Composition
Indoxacarbe : 50 g/l

Groupe
IRAC : 22A

Culture
Coton | Maraîchères
| Céréales

Cibles
Chenilles, Punaises,
Cicadelles, Altises,
Charançons,
Coléoptères

0,5-
0,75
l/ha



INDOXAN® PRO 350 WG

Insecticide large spectre

Formulation
WG

Composition
Indoxacarbe :
350 g/kg

Groupe
IRAC : 22A

Culture
Coton | Maraîchères
| Céréales

Cibles
Chenilles, Punaises,
Cicadelles, Altises,
Charançons,
Coléoptères

72-100
g/ha



JAZZFIRE® 500 WG

*Insecticide spécifique
contre les piqueurs-suceurs.*

Formulation
WG

Composition
Flonicamide 500g/kg

Groupe
IRAC : 29

Culture
Coton / Maraîchères /
Fruitières

Cibles
Jassides, Aleurodes,
Pucerons, Thrips, Punaises,
Cochenilles

100
g/ha





PACHA® 25 EC

*Insecticide binaire
large spectre*

Formulation
EC

Composition
Acetamipride :
10 g/l
Lambda
Cyhalothrine : 15
g/l

Groupe
IRAC : 4A
IRAC : 3A

Culture
Fruitières |
Maraîchères |
Vivrières

Cibles
Chenilles de
lépidoptères,
pucerons,
aleurodes, jassides,
thrips

1
l/ha



PACHA® ULTRA 175 WP

*Insecticide binaire
large spectre*

Formulation
WP

Composition
Acetamipride :
100 g/kg
Lambda
Cyhalothrine :
75 g/kg

Groupe
IRAC : 4A
IRAC : 3A

Culture
Fruitières |
Maraîchères |
Vivrières

Cibles
Chenilles de
lépidoptères,
pucerons,
aleurodes, thrips

200
g/ha



SPINOCUR® 480 SC

*Insecticide
biologique contre
les ravageurs
des cultures
maraîchères,
fruitières et
céréalières*

Formulation
SC

Composition
Spinosad : 480 g/l

Groupe
IRAC : 5

Culture
Céréalières |
Maraîchères |
Fruitières

Cibles
Chenilles, Thrips,
mouche des
fruits, mouches
mineuses...

0,1-0,2
l/ha



PYRIGA® SULTAN® 480 EC

*Insecticide
de contact et
d'ingestion à large
spectre d'action*

Formulation
EC

Composition
Chlorpyrifos-
ethyl : 480 g/l

Groupe
IRAC : 1B

Culture
Maraîchères |
Fruitières

Cibles
Cochenilles,
Chenilles,
Pucerons,
Aleurodes, Foreurs
de tronc, Scolyte
des baies, Acridiens

0,5-2
l/ha

savana

INSECTICIDES

généraux



TAMEGA® 25 EC



Insecticide à large spectre

Formulation
EC

Composition
Deltaméthrine :
25 g/l

Groupe
IRAC : 3A

Culture
Maraîchères |
Fruitières

Cibles
Chenilles, Pucerons,
Charançons,
Doryphores,
Cochenilles,
Mouches des fruits,
Criquets

0,5
l/ha



TEMA® 135 WG



Insecticide double action contre les chenilles

Formulation
WG

Composition
Emamectine benzoate : 60 g/kg
Teflubenzuron :
75 g/kg

Groupe
IRAC : 6
IRAC : 15

Culture
Coton | Maraîchères
| Céréales

Cibles
Chenilles

200
g/ha



WASHER® 40 EC

Insecticide binaire pour la culture de cacao

Formulation
EC

Composition
Alphacyperméthrine : 20 g/l
Acetamipride : 20 g/l

Groupe
IRAC : 3A
IRAC : 4A

Culture
Cacao | Maraîchères |
Fruitières

Cibles
Chenilles, Piqueurs-
suceurs, Insectes Broyeurs,
Mirides

0,5-1
l/ha





NEMA B2®

Insecticide-Nématicide pour le traitement du sol

Formulation
GR

Composition
Abamectine : 50 g/kg

Groupe
IRAC : 6

Culture
Toutes cultures

Cibles
Nématodes

10-20
kg/ha



NEMGUARD® GR

Insecticide-Nématicide d'origine naturelle et sans résidu

Formulation
GR

Composition
Extraits d'ail : 45 %

Culture
Toutes cultures

Cibles
Nématodes

20 à 25
kg/ha



NEMGUARD® L

Insecticide-Nématicide d'origine naturelle et sans résidu

Formulation
SL

Composition
Extraits d'ail : 100 %

Culture
Toutes cultures

Cibles
Nématodes

8 à 12
l/ha





ALADIN®

Insecticide fumigant à usage professionnel pour la protection des denrées stockées

Formulation
GE

Composition
Phosphure d'Aluminium : 56%

Groupe
IRAC : 24A

Culture
Denrées stockées

Cibles
Tout nuisibles

1-5
cp/m³



PROTECT DP® | PROTEGRAIN 16 DP®

Insecticide pour les denrées stockées

Formulation
DP

Composition
Deltaméthrine : 1 g/kg
Pyrimphos-méthyl : 15 g/kg

Groupe
IRAC : 3A
IRAC : 1B

Cibles
Alucite, Capucins,
Charançons, Teignes,
Vers de farine, Silvains,
Tribolium, Bruches

50 g/
100 kg
de grains





MOCID®

Molluscicide toutes cultures

Formulation
GR

Composition
Metaldehyde : 50 g/kg

Culture
Toutes cultures

Cibles

Limaces, Escargots

75-150g/
100m²





LOCUSTOP® 400 UL

*Insecticide de contact et
d'ingestion
pour la lutte
antiacridienne*

Formulation
UL

Composition
Fenitrothion : 400 g/l

Groupe
IRAC : 1B

Cibles
Criquets, Sauteriaux



SULTAN® 240 UL

*Insecticide de contact et
d'ingestion pour la lutte
antiacridienne*

Formulation
UL

Composition
Chlorpyrifos-ethyl : 240
g/l

Groupe
IRAC : 1B

Cibles
Criquets, Sauteriaux





SULTAN® 480 UL

*Insecticide
de contact et
d'ingestion pour la
lutte antiacridienne*

Formulation
UL

Composition
Chlorpyrifos-
ethyl : 480 g/l

Groupe
IRAC : 1B

Cibles
Criquets,
Sauteriaux

0,5
l/ha



ZALANG® 20 UL

*Insecticide
de contact et
d'ingestion pour la
lutte antiacridienne*

Formulation
UL


Composition
Lambda-
cyhalothrine :
20 g/l

Groupe
IRAC : 3A

Cibles
Criquets,
Sauteriaux

1
l/ha





BIOKILL®

*Insecticide biologique
contre
les simulies et
les moustiques*

Formulation
WP

Composition
Bacillus thuringiensis :
5 000 UI/mg

Groupe
IRAC : 11

Cibles
Simulies, Moustiques, gîtes
larvaires



PERMEKILL® 200 EC



*Insecticide pour
la lutte contre les
simulies et les
moustiques en
hygiène publique*

Formulation
EC

Composition
Permethrine :
200g/l

Groupe
IRAC : 3A

Cibles
Simulies,
Moustiques, gîtes
larvaires



RAC® 236 EC



*Insecticide pour
la lutte contre les
simulies et les
moustiques en
hygiène publique*

Formulation
EC

Composition
Deltamethrine :
20g/l
Tetramethrine :
30g/l
Piperonyl Butoxyde
(PBO) : 60g/l

Groupe
IRAC : 3A

Cibles
Simulies,
Moustiques, gîtes
larvaires

30-70
ml/
100m²





TEMEKILL® 500 EC

*Insecticide pour la lutte
contre les simulies et les
moustiques en hygiène
publique*

Cibles

Simulies, Moustiques, gîtes
larvaires



Formulation

EC

Composition

Temephos : 500 g/l

Groupe

IRAC : 1B



NOTOC





MOMTAZ® 45 WS

**Insecticide - Fongicide pour
le traitement des semences**

Formulation
WS

Composition
Imidaclopride : 250 g/kg
Thirame : 200 g/kg

Groupe
IRAC : 4A
FRAC : M3

Culture
Toutes cultures

Cibles
Insectes et maladies du sol

50-100 g
pour 10 kg
de semences



MOMTAZ® FLO 450 FS

**Insecticide -
Fongicide liquide
pour le traitement
industriel des
semences**

Formulation
FS

Composition
Imidaclopride :
350 g/l
Thirame : 100 g/l

Groupe
IRAC : 4A
FRAC : M3

Culture
Toutes cultures

Cibles
Insectes et
maladies du sol

40-70 ml
pour 10 kg
de semences



MOMTAZ® PRO 650 WS

**Insecticide -
Fongicide pour le
traitement des
semences**

Formulation
WS

Composition
Imidaclopride :
500 g/kg
Thirame :
150 g/kg

Groupe
IRAC : 4A
FRAC : M3

Culture
Toutes cultures

Cibles
Insectes et
maladies du sol

25-50 g
pour 10 kg
de semences



MOMTAZ® C 355 WS

**Insecticide -
Fongicide pour le
traitement des
semences**

Formulation
WS

Composition
Cyperméthrine :
300 g/kg
Thirame : 50 g/kg
Difenoconazole :
5 g/kg

Groupe

IRAC : 3A
FRAC : M3
FRAC : 3

Culture

Toutes cultures

Cibles
Insectes et
maladies du sol

100g
pour 10 kg
de semences



MOMTAZ® SYS 380 FS

**Insecticide -
Fongicide pour le
traitement des
semences**

Formulation
FS

Composition
Thiaméthoxame :
350 g/l
M-Metalaxyl :
15g/l
Difenoconazole :
15 g/l

Groupe

IRAC : 4A
FRAC : 4
FRAC : 3

Culture

Toutes cultures

Cibles
Insectes et
maladies du sol

30 ml
pour 10 kg
de semences



MOMTAZ® TRIO 675 WS

**Insecticide -
Fongicide pour le
traitement des
semences**

Formulation
WS

Composition
Imidaclopride :
500 g/kg
Thirame : 150g/kg
M-Metalaxyl :
25g/kg

Groupe

IRAC : 4A
FRAC : M3
FRAC : 4

Culture

Toutes cultures

Cibles
Insectes et
maladies du sol

25-50 g
pour 10 kg
de semences



FINISH® I DIGA FAGALAN® 360 SL

**Herbicide total
systémique non
sélectif**

Formulation
SL

Composition
Glyphosate acide :
360 g/l

Groupe

HRAC : 9

Culture

Toutes cultures

2-4
l/ha





TOTAL

FINISH® 68 SG

*Herbicide total
systémique non
sélectif*

Formulation
SG

Composition
Glyphosate :
680 g/kg

Groupe
HRAC : 9

Culture
Toutes cultures

1-3
kg/ha



TOTAL

GENGIS® 200 SL

*Herbicide total de
contact non sélectif*

Formulation
SL

Composition
Glufosinate
Ammonium :
200 g/l

Groupe
HRAC : 10

Culture
Toutes cultures

2-5
l/ha



PRÉ-LEVÉE

METONYX® 960 EC

*Herbicide
systémique de
pré-levée à large
spectre*

Formulation
EC

Composition
S-metolachlore :
960 g/l

Groupe
HRAC : 15

Culture
Coton | Maïs | Mil
| Sorgho | Niebe |
Arachide | Haricot |
Soja | Canne à sucre

| Ananas ...

0,5-2
l/ha



PRÉ-LEVÉE

PENDISTAR® 400 EC

*Herbicide
antigerminatif de
pré-levée à large
spectre*

Formulation
EC

Composition
Pendimethaline :
400 g/l

Groupe
HRAC : K1

Culture
Coton | Maïs |
Oignon | Mil |
Sorgho | Niebe |
Arachide | Haricot |
Soja | Canne à sucre

2-6
l/ha





PRÉ-LEVÉE



PENDISTAR® 455 CS

*Herbicide
antigerminatif de
pré-levée à large
spectre*

Formulation
CS

Composition
Pendimethaline :
455 g/l

Groupe
HRAC : 3

Culture
Coton | Maïs |
Oignon | Mil |
Sorgho | Niebe |
Arachide | Haricot
| Soja | Canne à
sucre...

2,2-3,5
l/ha



POST-LEVÉE



POWER® 800 WG

*Herbicide
systémique de
pré-levée à large
spectre*

Formulation
WG

Composition
Diuron : 800 g/kg

Groupe
HRAC : 5

Culture
Coton | Arachide
| Niebe | Canne à
sucre

0,7-4
kg/ha



POST-LEVÉE



MALIK® 108 EC

*Herbicide
systémique anti-
graminée de post-
levée*

Formulation
EC

Composition
Haloxyp-P-
méthyl : 108 g/l

Groupe
HRAC : 1

Culture
Coton | Cultures
dicotylédones |
Oignon

0,9
l/ha



PRÉ-LEVÉE



MIRACULOUS® 110 OD

*Herbicide
systémique complet
de post-levée*

Formulation
OD

Composition
Haloxyp-P :
100 g/l
Trifloxysulfuron
sodium : 10 g/l

Groupe
HRAC : 1
HRAC : 2

Culture
Coton

0,8-1
l/ha





POST-LEVÉE

OZANA® 11 OD

*Herbicide
systémique
anti-dicotylédone
de post-levée*

Formulation
OD

Composition
Trifloxysulfuron
sodium : 11 g/l

Groupe
HRAC : 2

Culture
Coton



1
l/ha



POST-LEVÉE

PYRICOT® 500 WP

*Herbicide
systémique de
post-levée*

Formulation
WP

Composition
Pyriathiobac-
sodium : 500 g/kg

Groupe
HRAC : 2

Culture
Coton



140
g/ha



POST-LEVÉE

QUARTZ® | KIZA® 100 EC

*Herbicide
systémique anti-
graminée de post-
levée*

Formulation
EC

Composition
Quizalofop-P-
ethyl : 100 g/l

Groupe
HRAC : 2

Culture
Coton | Cultures
dicotylédones |
Oignon



0,9
l/ha



MEPRO®

*Régulateur de
croissance*

Formulation
SL

Composition
Chlorure de
mepiquat : 250 g/l

Culture
Coton



0,2
l/ha



ABALAM® 58 EC

*Insecticide -
acaricide pour lutter
contre les ravageurs
du cotonnier*

Cibles
Chenilles, Acariens

Formulation
EC

Composition

Lambda-
cyhalothrine :
30 g/l

Abamectine : 28 g/l

Groupe

IRAC : 3A

IRAC : 6

Culture

Coton

0,5
l/ha



ALFACETA® 86 EC

*Insecticide binaire
pour lutter contre
les ravageurs du
cotonnier*

Cibles
Chenilles, pucerons,
aleurodes, jassides

Formulation
EC

Composition

Acetamipride :
50 g/l

Alphacyperme-
thrine : 36 g/l

Groupe

IRAC : 4A

IRAC : 3A

Culture

Coton

0,5
l/ha



ALFAZOL® 96 EC

*Insecticide -
acaricide pour lutter
contre les ravageurs
du cotonnier*

Cibles
Chenilles, Acariens

Formulation
EC

Composition

Etoxazole : 60g/l

Alphacyperme-
thrine : 36 g/l

Groupe

IRAC : 10B

IRAC : 3A

Culture

Coton

0,5
l/ha



ALPHACYGA® 180 EC

*Insecticide à large
spectre*

Cibles
Chenilles,
Pucerons, Thrips,
Doryphore, Psylles,
Cicadelles, Altises,
Charançons

Formulation
EC

Composition

Alphacyperme-
thrine : 180 g/l

Groupe

IRAC : 3A

Culture

Coton | Maraîchères

0,1
l/ha





BENJI® 250 SP

*Insecticide
systémique pour les
cultures du coton,
maraîchères et
fruitières*

Formulation
SP

Composition
Acetamipride :
250 g/kg

Groupe
IRAC : 4A

Culture
Coton | Maraîchères
| fruitières

Cibles
Aleurodes,
Pucerons, Jassides,
Mineuses

80-100
g/ha



BENJI® 700 WG

*Insecticide
systémique pour les
cultures du coton,
maraîchères et
fruitières*

Formulation
WG

Composition
Acetamipride :
700 g/kg

Groupe
IRAC : 4A

Culture
Coton

Cibles
Aleurodes,
Pucerons, Jassides,
Mineuses

28-35
g/ha



BIOK® 16

*Insecticide
biologique contre
les ravageurs du
coton, des cultures
maraîchères et
céréalières*

Formulation
WP

Composition
Bacillus
thuringensis :
16 000 UI/mg

Groupe
IRAC : 11

Culture
Coton | Maraîchères
| Céréales

Cibles
Piérides, Mineuses,
Noctuelles,
Tordeuses, Teignes
et Foreurs de tiges

1-2
kg/ha



BIOK® 32

*Insecticide
biologique contre
les ravageurs du
coton, des cultures
maraîchères et
céréalières*

Formulation
WP

Composition
Bacillus
thuringensis :
32 000 UI/mg

Groupe
IRAC : 11

Culture
Coton | Maraîchères
| Céréales

Cibles
Piérides, Mineuses,
Noctuelles,
Tordeuses, Teignes
et foreurs de tiges

0,5-1
kg/ha



CALIFE® 500 EC

*Insecticide contre
les ravageurs du
cotonnier*

Formulation
EC


Composition
Profénofos : 500 g/l

Groupe
IRAC : 1B

Culture
Coton

Cibles
Chenilles

1
l/ha



DELTAPYR® 84 EC

*Insecticide binaire
pour lutter contre
les ravageurs du
cotonnier*

Formulation
EC

Composition
Deltaméthrine :
24 g/l
Pyriproxifène :
60 g/l

Groupe
IRAC : 3A
IRAC : 7A

Culture
Coton

Cibles
Chenilles,
aleurodes,
pucerons, jassides

0,5
l/ha



EMABA® 40 EC

*Insecticide -
acaricide pour lutter
contre les ravageurs
du cotonnier*

Formulation
EC

Composition
Emamectine
benzoate : 20 g/l
Abamectine : 20 g/l

Groupe
IRAC : 6
IRAC : 6

Culture
Coton

Cibles
Chenilles, Acariens

0,5
l/ha



EMACOT® 019 EC

*Insecticide anti-
chenilles*

Formulation
EC

Composition
Emamectine
benzoate : 19 g/l

Groupe
IRAC : 6

Culture
Coton | Maraîchères
| Céréales

Cibles
Chenilles

0,5
l/ha





EMACOT® 050 WG

Insecticide anti-chenilles

Formulation
WG

Composition
Emamectine benzoate : 50 g/kg

Groupe
IRAC : 6

Culture
Coton | Maraîchères
| Céréales

Cibles
Chenilles

200-240
g/ha



EMACOT® 112 EC

Insecticide binaire pour lutter contre les ravageurs du cotonnier

Formulation
EC

Composition
Emamectine benzoate : 48 g/l
Acetamipride : 64 g/l

Groupe
IRAC : 6
IRAC : 4A

Culture
Coton

Cibles
Chenilles,
Pucerons,
Aleurodes, Thrips,
Jassides

0,25
l/ha



EMACOT® PRO 300 WG

Insecticide anti-chenilles

Formulation
WG

Composition
Emamectine benzoate : 300 g/kg

Groupe
IRAC : 6

Culture
Coton | Céréales

Cibles
Chenilles

40
g/ha



EMACOT® TRIO 268 SL

Insecticide ternaire pour lutter contre les ravageurs du cotonnier

Formulation
SL

Composition
Emamectine benzoate : 48 g/l
Acetamipride : 100g/l
Etoxazole : 120g/l

Groupe
IRAC : 6
IRAC : 4A
IRAC : 10B

Culture
Coton

Cibles
Chenilles,
Pucerons,
Aleurodes, Thrips,
Jassides

0,25
l/ha



EMAPYR® 80 EC



*Insecticide binaire
pour lutter contre
les ravageurs du
cotonnier*

Formulation
EC

Composition
Emamectine
benzoate : 20g/l
Pyriproxyfene :
60g/l

Groupe
IRAC : 6
IRAC : 7A

Culture
Coton

Cibles
Chenilles,
aleurodes,
pucerons

0,5
l/ha



EMARON® 100 EC



*Insecticide double
action contre les
chenilles*

Formulation
EC

Composition
Emamectine
benzoate : 20 g/l
Lufenuron : 80 g/l

Groupe
IRAC : 6
IRAC : 15

Culture
Coton | Maraîchères
| Céréales

Cibles
Chenilles

0,5
l/ha



EMIR® FORT 104 EC



*Insecticide binaire
pour lutter contre
les ravageurs du
cotonnier*

Formulation
EC

Composition
Cyperméthrine :
72g/l
Acétamipride :
32g/l

Groupe
IRAC : 3
IRAC : 4A


Culture
Coton

Cibles
Chenilles,
aleurodes,
pucerons, jassides

0,5
l/ha



EMIR® ULTRA 208 EC



*Insecticide binaire
pour lutter contre
les ravageurs du
cotonnier*

Formulation
EC

Composition
Cyperméthrine :
144 g/l
Acétamipride :
64 g/l

Groupe
IRAC : 3
IRAC : 4A

Culture
Coton

Cibles
Chenilles,
aleurodes,
pucerons, jassides

0,25
l/ha





IMPERATOR® 200 SC

*Insecticide contre
les chenilles*

Formulation
SC


Composition
Cyhalodiamide :
200 g/l

Groupe
IRAC : 28

Culture
Coton

Cibles
Chenilles

0,1-0,15
l/ha



INDOXAN® 50 EC

*Insecticide large
spectre*

Formulation
EC

Composition
Indoxacarbe : 50 g/l

Groupe
IRAC : 22A

Culture
Coton | Maraîchères
| Céréales

Cibles
Chenilles, Punaises,
Cicadelles, Altises,
Charançons,
Coléoptères

0,5-
0,75
l/ha



INDOXAN® DUO 220 EC

*Insecticide binaire
pour lutter contre
les ravageurs du
cotonnier*

Formulation
EC

Composition
Indoxacarbe :
120 g/l
Acetamipride :
100 g/l

Groupe
IRAC : 22A
IRAC : 4A

Culture
Coton

Cibles
Chenilles, Punaises,
Cicadelles, Altises,
Charançons,
Coléoptères,
Jassides, Aleurodes,
Pucerons

0,25
l/ha



INDOXAN® PRO 350 WG

*Insecticide large
spectre*

Formulation
WG

Composition
Indoxacarbe :
350 g/kg

Groupe
IRAC : 22A

Culture
Coton | Maraîchères
| Céréales

Cibles
Chenilles, Punaises,
Cicadelles, Altises,
Charançons,
Coléoptères

72-100
g/ha



JAZZFIRE® 500 WG

*Insecticide
spécifique contre
les piqueurs-
suceurs.*

Formulation
WG

Composition
Flonicamide 500g/
kg

Groupe
IRAC : 29

Culture
Coton /
Maraîchères /
Fruitières

Cibles
Jassides, Aleurodes,
Pucerons,
Thrips, Punaies,
Cochenilles

100
g/ha



TEMA® 135 WG

*Insecticide double
action contre les
chenilles*

Formulation
WG

Composition
Emamectine
benzoate : 60 g/kg
Teflubenzuron :
75 g/kg

Groupe
IRAC : 6
IRAC : 15

Culture
Coton | Maraîchères
| Céréales

Cibles
Chenilles

200
g/ha



TRIDENT® 92 EC

*Insecticide pour
lutter contre les
ravageurs du
cotonnier*

Formulation
EC

Composition
Bifenthrine : 60 g/l
Acetamipride :
32 g/l

Groupe
IRAC : 3
IRAC : 4A

Culture
Coton

Cibles
Chenilles, Acariens,
Piqueurs-suceurs

0,5
l/ha



VIZIR® C 92 EC

*Insecticide -
acaricide pour lutter
contre les ravageurs
du cotonnier*

Formulation
EC

Composition
Cyperméthrine :
72 g/l
Abamectine : 20 g/l

Groupe
IRAC : 3A
IRAC : 6

Culture
Coton

Cibles
Chenilles, Acariens


0,5
l/ha





የወጪ





AZOX® 250 SC

*Fongicide systémique
global*

Formulation
SC

Composition
Azoxystrobine : 250 g/l


Groupe
FRAC : 11

Culture
Maraîchères | Fruitières |
Vivrière

Cibles

Rouille, Alternariose,
Sclerotiniose, Oïdium,
Mildiou, Anthracnose,
Moniliose, Criblure,
Cercosporiose,
Pyriculariose,
Helminthosporiose,
Septoriose

1
l/ha



AZOX® PRO 800 WG

*Fongicide
systémique global*

Formulation
WG

Composition
Azoxystrobine :
800 g/kg

Groupe
FRAC : 11

Culture
Maraîchères |
Fruitières | Vivrière

Cibles

Rouille,
Alternariose,
Sclerotiniose,
Oïdium, Mildiou,
Anthracnose,
Moniliose, Criblure,
Cercosporiose,
Pyriculariose,
Helminthosporiose,
Septoriose

300
kg/ha



BLACK OUT® 660 WP

*Fongicide
systémique pour la
culture du cacao*

Formulation
WP

Composition
M-metalaxyl :
60 g/kg
Oxyde de cuivre :
600 g/kg

Groupe
FRAC : 4
FRAC : M1

Culture
Cacao | Maraîchères
| Fruitières

Cibles

Pourriture brune
des cabosses,
Anthracnose,
Mildiou, Rouille,
Alternariose,
Helminthosporiose,
Cercosporiose,
Bactérioses

1
kg/ha





DIFENOSAV® 250 EC

Fongicide
systémique à large
spectre

Formulation
EC

Composition
Difenoconazole :
250g/l

Groupe
FRAC : 3

Culture
Maraîchères |
Fruitières

Cibles
Anthracnose
Rouille,
Alternariose,
Oïdium, Rhizoctone,
Pourriture grise,
Moniliose,
Cercosporiose...

0,5
kg/ha



ESSEM® 800 WG

Fongicide naturel

Formulation
WG

Composition
Soufre : 800 g/kg

Groupe
FRAC : M2

Culture
Maraîchères |
Fruitières

Cibles
Oïdium

5-7,5
kg/ha



FONGICUR® 50 EC

Fongicide
systémique à large
spectre

Formulation
EC

Composition
Hexaconazole :
50 g/l

Groupe
FRAC : 3

Culture
Maraîchères |
Fruitières

Cibles
Anthracnose
Rouille,
Alternariose,
Oïdium, Rhizoctone,
Pourriture grise,
Moniliose,
Cercosporiose,
Pyriculariose,
Helminthosporiose

0,5
l/ha



FONGIPRO® 820 WG

Fongicide binaire
à large spectre

Formulation
WG

Composition
Cymoxanil :
120 g/kg
Oxychlorure de
cuivre : 700 g/kg

Groupe
FRAC : 27
FRAC : M1

Culture
Cacao | Maraîchères
| Fruitières

Cibles
Pourriture brune
des cabosses,
Anthracnose,
Mildiou, Rouille,
Alternariose,
Helminthosporiose,
Cercosporiose,
Bactérioses

1
kg/ha



FONGSIN® 450 SC

Fongicide
systémique à large
spectre

Formulation
SC

Composition
Thiophanate-
methyl : 450 g/l

Groupe
FRAC : 1

Culture
Maraîchères |
Fruitières

Cibles
Oïdium,
Anthracnose,
Maladie des taches
brunes

1-3
l/ha



HIPRO® 500 SC

Fongicide de
contact large
spectre

Formulation
SC

Composition
Iprodione : 500 g/l

Groupe
FRAC : 2

Culture
Maraîchères |
Fruitières

Cibles
Alternariose,
Botrytis,
Rhizoctone,
Sclerotiniose,
Moniliose

1,5
l/ha



IDEFIX®

Fongicide -
Bactéricide naturel
pour les cultures
maraîchères et
fruitières

Formulation
WP

Composition
Hydroxyde de
cuivre : 65.6%

Groupe
FRAC : M1

Culture
Maraîchères |
Fruitières

Cibles
Rouille,
Alternariose,
Cladosporiose,
Mildiou,
Anthracnose,
Cercosporiose,
Bactérioses

2-4
kg/ha



MANGA® PLUS 800 WP

Fongicide de contact
à large spectre
pour les cultures
maraîchères et
fruitières

Formulation
WP

Composition
Mancozèbe :
800g/kg


Groupe
FRAC : M3

Culture
Maraîchères |
Fruitières

Cibles
Mildiou,
Anthracnose,
Rouille,
Cercosporiose,
Alternariose,
Helminthosporiose,
Pyriculariose

2-3
kg/ha





PROLEV® 722 SL

*Fongicide Systémique pour
les maladies du sol et
foliaires*

Formulation
SL


Composition
Propamocarbe : 722 g/l

Groupe
FRAC : F4

Culture
Maraîchères

Cibles
Mildiou, Fonte de semis,
Pourriture des racines

1-2
l/ha



TALO® 720 SC

*Fongicide de contact à large
spectre*

Formulation
SC

Composition
Chlorothalonil :
720 g/l

Groupe
FRAC : M5

Culture
Bananes | Fruitières |
Maraîchères | Vivrières

Cibles
Rouille, Alternariose,
Cladosporiose,
Mildiou, Anthracnose,
Cercosporiose,
Helminthosporiose,
Septoriose,
Rhynchosporiose, Oïdium

1-2
l/ha





BIOK® 16 | BIOK® 32

Insecticide biologique
contre les ravageurs
du coton, des cultures
maraichères et céréalières
Formulation
WP

Groupe
IRAC : 11

Culture
Maraichères | Céréales |
Coton

Cibles
Piérides, Mineuses,
Noctuelles, Tordeuses,
Teignes, Foreurs de tiges

COMPOSITION

BIO K 16
Bacillus thuringiensis :
16 000 UI/mg

0,5-1
kg/ha

BIO K 32
Bacillus thuringiensis :
32 000 UI/mg

1-2
kg/ha



BIOPIQ®

Insecticide
biologique contre
les insectes
piqueurs-suceurs et
acariens

Formulation
SL

Composition
Matrine : 0.6%

Culture
Maraichères |
Céréales | Fruitières

Cibles
Acariens, Pucerons,
Aleurodes, Thrips,
Jassides

1
l/ha



ESSEM® 800 WG

Acaricide - Fongicide
naturel

Formulation
WG

Composition
Soufre : 800 g/kg

Groupe
IRAC : UN
FRAC : M2

Culture
Maraichères |
Fruitières

Cibles
Acariens, Oïdium

5-7,5
kg/ha





IDEFIX®

*Fongicide -
Bactéricide naturel
pour les cultures
maraîchères et
fruitières*

Formulation
WP

Composition
Hydroxyde de
cuivre : 65.6%

Groupe
FRAC : M1

Culture
Maraîchères |
Fruitières

Cibles
Rouille,
Alternariose,
Cladosporiose,
Mildiou,
Anthracnose,
Cercosporiose,
Bactérioses

2-4
kg/ha



NEMGUARD® GR

*Insecticide-
Nématicide
d'origine naturelle
et sans résidu*

Formulation
GR

Composition
Extraits d'ail : 45 %

Culture
Toutes cultures

Cibles
Nématodes

20 à 25
kg/ha



NEMGUARD® L

*Insecticide-
Nématicide
d'origine naturelle
et sans résidu*

Formulation
SL

Composition
Extraits d'ail : 100 %

Culture
Toutes cultures

Cibles
Nématodes

8 à 12
l/ha



SPINOCUR® 480 SC

*Insecticide
biologique contre
les ravageurs
des cultures
maraîchères,
fruitières et
céréalières*

Formulation
SC

Composition
Spinodosad : 480g/l

Groupe
IRAC : 5

Culture
Maraîchères
| Fruitières |
Céréalières

Cibles
Chenilles, Thrips,
Mouche des
fruits, Mouches
mineuses...

0,1-0,2
l/ha





INVADER-B-LOK® | INVADER®

Pièges attractifs prêts à l'emploi pour lutter contre les mouches des fruits

Formulation
Bloc de fibres imprégné

Culture
Mangues | Fruitières | Maraîchères

COMPOSITION
INVADER-B-LOCK :
ME + Malathion

Cibles
Mouche des fruits

12
blocs/ha

INVADER :
ME + Spinosad



M3® FRUIT FLY BAIT STATION

Pièges attractifs prêts à l'emploi pour lutter contre les mouches des fruits

Formulation
Support plastique avec mousse de polyuréthane imprégnée

Culture
Mangues | Fruitières | Maraîchères

COMPOSITION
Hydrolysate de protéines + Alphacypermethrine

Cibles
Mouche des fruits

100-400
pièges/ha

THONON - JUSQU'À





FOLIGA® D

- *Booste la croissance végétative*
- *Récupération rapide après une période de stress*
- *Améliore la nutrition par les racines*

Utilisation

Repiquage, période de stress
1-2 applications
Intervalle d'application : 15-20 jours

30-45
ml/15l




FOLIGA® C

- *Améliore la vitalité des fleurs (fermetés des pétales, qualité du pollen)*
- *Meilleure nouaison*
- *Optimise le transfert d'énergie dans la plante*

Utilisation

Préfloraison, floraison, nouaison
2 - 3 applications
Intervalle d'application : 15-20 jours

25-30
ml/15l



FOLIGA® P

- *Augmente le calibre et la couleur des fruits*
- *Accélère le murissements des fruits*
- *Améliore la résistance aux maladies et à la sécheresse*
- *Prolonge la durée de vie post-récolte*

Utilisation

Chute des pétales, remplissage des fruits
2 - 3 applications
Intervalle d'application : 15-20 jours

30-45
ml/15l



NUTRIGA®

Engrais simples, composés ou complexes destinés à la fertilisation des cultures vivrières et maraichères, ou aux plantations agro-industrielles

LES GRANULÉS

- **ASN 26 n**
- **SKM 14 k**
- **SKM 32 k**
- **TRIPLE 17...**
- ...

Utilisation

Fertilisation de fonds
Granulométrie suivant
application (manuelle ou
mécanique)

LES SOLUBLES

- **PRODUCTION**
- **SOP 50 k**
- ...

Utilisation

Application en solution
dans l'eau, en pulvérisation
foliaire ou en goutte à
goutte dans le réseau
d'irrigation





SMARTFOIL®

Smartfoil est une formulation unique et innovante composée de métabolites de fermentation provenant de la production de levure.

Smartfoil améliore la vigueur de la plante et augmente le rendement en réduisant l'avortement à la floraison. Il réduit l'impact des stress abiotiques

(Sécheresse, Chaleur) et favorise la fructification, ce qui entraîne une augmentation du rendement.

Smartfoil est utilisable en agriculture biologique

2-4
l/ha



NEUTRAFLORE®

Neutraflores renforce la fertilité biologique des sols, assure une bonne nutrition des plantes et augmente sa résistance face aux aléas climatiques et aux stress. Neutraflores est utilisable en agriculture biologique.



MYCO'SOL®

Myco'sol renforce la fertilité biologique des sols, assure une bonne nutrition des plantes et augmente sa résistance face aux aléas climatiques et aux stress.



S

O

M





PROTESCIAGE IF SUPER®

*Insecticide - Fongicide pour
grumes et bois de sciage*

0,2-0,4l
pour
1m²

Formulation
EC

Composition

Thiamethoxam: 6 g/l

IPBC: 15 g/l

Propiconazole: 15 g/l

Groupe

IRAC : 4A

FRAC : 40

FRAC : 3

Culture

Bois




PROTEGERCE®

*Emulsion de paraffine de
haute qualité contre les
gerces, les fentes et le
dèssèchement des grumes
et des bois de sciage*



0,2-0,4l
pour
1m²

PRÉSENCE GÉOGRAPHIQUE



savana

LA PUISSANCE D'UN GROUPE



ALBISIA

Sénégal

Tél. : +221 77 149 68 68

ANTEOR

Togo

Tél. : + 228 91 63 14 05 / 91 81 57 26

GCIAE

Gabon

Tél. : +241 011 72 06 56 / 011 76 48 99

HPP

Cameroun

Tél. : +237 695 39 95 93

INDIGO

RDC

Tél. : +243 (0) 990 77 42 90

KORAMA

Niger

Tél. : +227 20 35 23 49 / 96 96 22 27

PROPHYMA


Burkina Faso

Tél. : +226 20 98 39 40 / 20 98 58 29

SAVANA CÔTE D'IVOIRE

Côte d'Ivoire

Tél. : + 225 07 69 91 49 30



GROUPE
savana

23, chemin de la Forêt
74200 THONON-LES-BAINS
FRANCE

+(33) 4 50 26 61 74
www.savana-france.com

ÉDITION 2023